

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА
VITAMIN C
ВИТАМИН С

ИАЛ
ОДОБРЕНО:
ДАТА 23.03.04

СЪСТАВ

Лекарствено вещество: Ascorbic acid 100 mg.

Помощни вещества: микрокристална целулоза РН 101, безводна глюкоза, стеаринова киселина, талк, боя Eurolake Quinoline Yellow 21 E 104.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

Таблетки 100 mg в блистери от PVC/AL фолио.

По 40 броя в блистер. По 1 блистер в картонена кутия.

По 10 броя в блистер. По 4 блистера в картонена кутия.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Балканфарма-Дупница АД, гр. Дупница,

“Самоковско шосе”, № 3, п.к. 2600

Тел. (0701) 2-42-81/2-90-21/29

Факс: (0701) 2-42-81/82; 2-81-62

ДЕЙСТВИЕ

Човешкият организъм не може да синтезира аскорбинова киселина и затова трябва да си я доставя чрез храната отвън. Витамин С участва в голям брой метаболитни процеси, като спомага за усвояване на въглехидратите и белъците, за образуване на някои хормони, за постъпване на желязото в организма. Взема участие в процесите на кръвосъсирване. Включва се в много основни обменни процеси, включително и в синтезата на витамин B₁₂. Във връзка с участиято си в тези процеси, Витамин С повлиява възпалителните и алергични реакции и подпомага възстановителните и защитните процеси в организма.

Дневната нужда от Витамин С за поддържане на необходимото телесно количество от 3500 mg е 60-100 mg дневно. Нуждата от витамина се увеличава при тежък и изтощителен труд, при пушачи, инфекциозни болести и др.

ПОКАЗАНИЯ

За профилактика и лечение на състояния на хипо- и авитаминоза С:

- При продължителни физически и психически натоварвания, повышен риск от вирусни и бактериални инфекции, недоимъчно хранене и понижен имунитет, както и в период на възстановяване.
- В комбинираната терапия при инфекциозни заболявания, желязодефицитни анемии, хеморагична диатеза (склонност към кървене) свързана с повишена капилярна пропускливост.

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Противопоказания

Алергични прояви към някоя от съставките на продукта.



Специални предпазни мерки при употреба

Тютюнопушенето намалява усвояването на Витамин С. Приемането му в голяма доза може да повлияе на резултатите от изследването на някои лабораторни тестове (трансаминази, лактатдехидрогеназа, билирубин и пробите за кръв в изпражненията). Високи дози от витамина (над 2 г дневно) могат да променят и някои от тестовете за откриване на глюкоза и креатинин в кръвта и урината.

Поради леко стимулиращия ефект на Витамин С е желателно да не се приема в края на деня.

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАЙМОДЕЙСТВИЯ

Витамин С може да промени разграждането на редица лекарствени продукти. Може да подкисели урината и да намали бъбречната реабсорбция на някои лекарствени продукти (с алкален характер), което налага увеличаване на дозите на повечето лекарства, особено при високи дози на Витамин С.

Витамин С, приложен заедно с ацетилсалицилова киселина, повишава плазмените нива и ефектите на салицилатите.

Може да намали ефектите на амфетамини и на трициклични антидепресанти поради понижена ренална тубулна реабсорбция.

Има взаимно потенциращо се действие при приемане с лекарствени продукти съдържащи гонадотропни хормони и Витамин B₁, а антагонизиращо с тироксин.

Едновременното приложение с дефероксамин увеличава екскрецията на желязо в урината. Аскорбиновата киселина повишава плазмените нива на естрогените продукти и всички орални контрацептиви.

Витамин С трябва да се приема на двучасов интервал от Витамин B₁₂, защото се разгражда от него.

Във високи дози Витамин С може да удължи протромбиновото време и да намали ефекта на антикоагулантите.

Амониев хлорид намалява нивото на витамина в плазмата.

Витамин С, приложен в дози над 1 г/дневно, увеличава елиминирането на алкохола, поради активиране на алкохол-дехидрогеназата.

Предупреждения при специални групи пациенти

Витамин С трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с някои вродени заболявания (фенилкетонурия, глюкозо 6 фосфатазен дефицит, хемохроматоза, таласемия, глюкозо-изомалтазна недостатъчност, сидеробластна анемия) с бъбречно каменна болест, както и при състояния придвижени с повишена съсираваемост на кръвта.

Приложение при бременност и в периода на кърмене

Не се препоръчва приема на големи дози Витамин С по време на бременността, тъй като той преминава през плацентата и може да увреди плода. Назначаването на такива дози трябва да стане от лекар след преценка на съотношението полза/risk.

Отделя се в кърмата и при нормален прием на Витамин С от майката не е необходимо допълнително приемане от кърмачето.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Продуктът не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА

Дозировка и начин на приложение

Прилага се през устата. Приема се с вода.

Препоръчителни дози:

Възрастни - от 100 до 600 мг дневно (една до шест таблетки дневно);

Деца от 1 до 6 години - 100 мг (една таблетка дневно);

Деца над 6 години - от 100 до 300 мг (една до три таблетки дневно).

ПРЕДОЗИРАНЕ

При предозиране могат да се появят някои от следните симптоми: повищена склонност към кръвосъсирване, тромбофлебити и тромбози, неспокойствие, безсъние или сънливост, главоболие, коремни болки, повръщане, разстройство. Силното подкиселяване на урината води у предразположени хора до образуване на бъбречни камъни.

При наблюдаване на някои от проявите на предозиране е необходимо да се прекрати приема на продукта и да се назначат симптоматични средства.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Обикновено са леки и преминават бързо след прекратяване приема на продукта. При продължително приемане на високи дози Витамин С (над 1 г/дн) може да се потисне освобождаването на инсулин или да се наблюдават главоболие, гадене, повръщане, разстройство, колики, зачервяване на кожата, повищено отделяне на урина. Приемът на високи дози може създаде условия за образуване на бъбречни камъни.

СЪХРАНЕНИЕ

При температура под 25°C.

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

СРОК НА ГОДНОСТ

3 /три/ години от датата на производство

ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ

Януари 2004 г.

